

## شرح واقعه نادر Behcet Syndrome با التهاب مزمن غشا ساینوویل هر دو مفصل زانو.

پوهندوی دوکتور محمد ولی ناصری دیپارتمنت داخله اندوکراین و روماتولوژی

### خلاصه

مقدمه: Behcet Syndrome یک تشوش التهابی نادر است که چندین سیستم بدن را متأثر ساخته و متصف به قرحات متکرر Aphthous فمی و نواحی تناسلی می باشد.

اعراض این سندروم عبارت از قرحات متکرر غشا مخاطی دهن و نواحی تناسلی است که بشکل بنفسه بهبودی یافته و دوباره عود مینماید. التهاب چشم ها (Anterior uveitis, Posterior uveitis, Pan uveitis) هم بخش از تظاهرات مرض بوده که مریضان سندروم Behcet را متأثر می سازند. اعضا دیگر بدن از قبیل مفاصل، اوعیه، سیستم عصبی مرکزی و جهاز هضمی نیز ممکن در این مرض مصاب گردند.

سبب مرض معلوم نبوده و بعضی مطالعات نشان می دهد که ممکن سبب آن مساعدت ارثی باشد. این مرض به HLA نیز ربط داشته و محققان یافته اند که آنهائیکه در آسیا و شرق میانه به این سندروم مصاب اند اکثراً دارای HLA B-51 می باشند.

### شرح واقعه

مریض یک مرد ۳۰ ساله متأهل باشنده اصلی ولایت لوگر بتاريخ ۹/۷/۹۵ به سرویس داخله شفاخانه تدریسی علی آباد مراجعه نموده و در همین روز به تشخیص ابتدائی Recurrent aphthous ulcer و Knee joint arthritis بستر گردیده است. به اساس اظهارات مریض، شخص مذکور از چهار الی پنج سال به اینطرف از زخم های دردناک در دهن رنج می برد، که این زخم ها بشکل متکرر تاسس مینمودند و بعد از یک مدتی دوباره شفا یاب شده و دوباره عود می نمودند. این زخم ها در تمام قسمت های غشا مخاطی دهن بوجود آمده و در قسمت لب سفلی بیشتر دیده می شدند، همچنان مریض از درد و تورم هر دو مفصل زانو از مدت چهار الی پنج سال به اینطرف حکایت مینمود که این مشکل در زانو چپ نسبت به زانو راست شدید تر بوده ولی دیگر مفاصل مریض سالم بوده و مریض از درد و تورم کدام مفصل دیگر و یا شخی صبحانه شاکی نبود.

علاوفا مریض از تاسس زخم در قسمت ظهری آله تناسلی پائین تر از Glans penis از مدت دو ماه به این طرف شاکی بود. همچنان مریض از ناراحتی ناحیه Epigastric شکایت داشته ولی از تشوش رویت و یا مشکل چشم حکایه نمی نمود.

### نتیجه نهائی

معیارات که توسط گروه جهانی مطالعه Behcet Syndrome International Study Group Criteria بخاطر تشخیص Behcet Syndrome وضع نموده اند، طوری اند که موجودیت همزمان یک معیار ضروری و دو معیار کوچک تشخیص مرض را تثبیت می نماید، در معیارات ضروری تنها یک معیار وجود دارد که عبارت از قرحات متکرر فمی است، در معیارات کوچک قرحات متکرر نواحی تناسلی، آفات چشم، آفات جلدی و مثبت بودن آزمایش Pathergy می باشد.<sup>۲</sup>

در این مریض تمام معیارات فوق الذکر بدون آفت چشم وجود داشت. بناً با در نظر داشت معیارات فوق الذکر این مریض به لوحه Behcet Syndrome تشخیص گردیده، که بعد از تشخیص تداوی در جهت اصلاح قرحات فمی، قرحات نواحی تناسلی و التهاب مفصلی تنظیم گردید.